

PECES Y CETÁCEOS FÓSILES DE LA CUENCA DE ALCOY (DEL CRETÁCICO AL MIOCENO)

Durante el Mioceno la cuenca de Alcoy se encuentra sumergida, formando parte de un mar de aguas templadas y profundas. Como especie destacable encontramos el **Carcharodon megalodon** (tiburón fósil que alcanzaba 25 m.) Al final del Mioceno se cierra el Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar y se deseca (hace 6,5 m.a.)

M.A.
0,2
2

CUATERNARIO

Holoceno

Pleistoceno

NEÓGENO

Plioceno


Mioceno



MIOCENO INFERIOR



MIOCENO SUPERIOR



MIOCENO



• ÁREA DE ALCOY



Carcharodon megalodon. mioceno



Huesos indet. de cetáceo



Odontaspis sp. mioceno

Pieza sin identificar



Isurus hastalis. mioceno



Labrodon sp. mioceno



Carcharinus egertoni. oligoceno



Carcharodon carcharias. mioceno



Diplodus sp. mioceno



Hexanchus sp. mioceno



Sparus cinctus. mioceno



Hemipristis sp. mioceno



Dentex sp. mioceno



Baliste sp. mioceno



Barracuda sp. mioceno



Galeocerdo sp. mioceno



Cretoxyrhina sp. cretácico



Mylobatis sp. mioceno



Carcharhinus priscus. mioceno



Dasyatis sp. mioceno



Isurus oxyrinchus. mioceno



Diodon sp. mioceno

23,5

Oligoceno

Eoceno

Paleoceno

65

CRETÁCICO

Superior